

FICHA TECNICA



PECANA



— CONSORCIO —
FRUTIFOSKA
— DEL CAMPO AL FUTURO —

Frutifoska Special 12+12+17

Es un fertilizante complejo a base de NPK con sulfato de potasio, magnesio y micronutrientes (sin cloruro de potasio). Para la fertilización de fondo y de cobertera de cultivos sensibles al cloruro y en suelos con alto contenido de sales; para la horticultura y cultivos en invernaderos y al aire libre.

Otros nutrientes:

Frutifoska Special 12+12+17 contiene además 5 % de calcio (CaO) así como trazas de cobre (Cu), manganeso (Mn) y molibdeno (Mo) proveniente de las materias primas minerales empleadas (Minerales con fosfato y con potasio).

Características físicas:

Fertilizante mineral complejo granulado con tratamiento de superficie para mejorar sus cualidades de transporte y almacenamiento.

Recomendaciones de aplicación:

Frutifoska Special 12+12+17 es especialmente apropiado para:

- ✓ La fertilización de suelos cultivados en forma intensiva con bajos / medianos contenidos de fosfatos
- ✓ La fertilización de fondo y de cobertera de cultivos intensivos como plantas ornamentales y hortícolas en invernaderos y al aire libre y frutales.
- ✓ Para arbustos y plantas de jardín

Acidez fisiológica:

Frutifoska Special 12+12+17 tiene una acidez fisiológica pequeña. La acción teórica fisiológica de 100 Kg de **Frutifoska Special 12+12+17** equivale según la fórmula de Sluijsman a aprox. 10Kg Cao

DATOS TÉCNICOS:

Nutrientes principales:

12.2 % Nitrógeno total (N)
7% nitrógeno amoniacal (NH_4)
5% nitrógeno nítrico (NO_3)
12.0 % Fósforo (P_2O_5)
17.0 % Potasio (K_2O)

Nutrientes secundarios:

2.0 % Magnesio (MgO)
8.0 % Azufre (SO_3)

Micronutrientes:

0,20 % Hierro (Fe)	0,02 % Boro (B)
0,01 % Zinc (Zn)	

Color:	Terracota	
Diámetro de los gránulos:	90 % entre	2.0 - 5.0 mm
	Promedio	3.0 - 3.6 mm
Peso específico:	Aprox. 1.1 t/m ³	



Dosis Sugerida:

Cultivo	Dosis kg/ha	Recomendaciones de uso
Ají, páprika	200 a 250 kg/ha Urea 100 a 150 kg/ha	Usarlo en fertilización de fondo (trasplante o desahije), repetir en el segundo abonamiento.
Arroz	100 a 200 kg/ha Urea 150 a 200 kg/ha	Abonar como fertilización de fondo 15 días después del trasplante.
Café	60 a 80 g/planta 180 a 240 g/planta - año	1era aplicación 2 meses después de la cosecha, 2da aplicación al inicio de floración, 3era aplicación al llenado del grano.
Camote	250 a 300 kg/ha	Aplicar 20 días después de la siembra.
Cebolla roja, ajo	300 a 400 kg/ha Urea 150 kg/ha	Usarlo en la fertilización de fondo.
Durazno	750 a 1000 g/árbol	Aplicar a inicio de brotación y un mes después del cuajado.
Limón	2 a 3 kg/árbol	Aplicar en dos momentos, al inicio de brotación y después del cuajado.
Maíz	250 a 300 kg/ha Urea 100 a 150 kg/ha	Fertilización de fondo de 8 a 10 días después de la siembra o al momento de la siembra (con sembradora – abonadora)
Mandarina	1 a 1.5 kg/árbol	Aplicar en dos momentos inicio de brotación y después del cuajado.
Mango	1.5 a 2 kg/árbol	Aplicar a inicio de brotación. A inicio de cuajado.
Manzano	200 a 300 g/árbol	Aplicar a inicio de brotación y un mes después del cuajado.
Naranja / Tangelo	1.5 kg/árbol	Aplicar en dos momentos, al inicio de brotación y después del cuajado.
Palto	1.5 kg/árbol 1.0 kg/árbol	Aplicar a inicio de brotación. Al inicio de cuajado.
Papa	500 a 700 kg/ha	Usarlo en la fertilización de fondo (a la siembra).
Sandía, melón, zapallo	300 a 400 kg/ha Urea 150 kg/ha	Usarlo en la fertilización de fondo (a la siembra).
Tomate	400 a 500 kg/ha	Usarlo en la fertilización de fondo (desahije o trasplante).
Vid	150 a 200 g/planta	Aplicar a inicio de brotación y un mes después del cuajado.

Presentación:

Bolsas de 50 kilos.



CONSORCIO
FRUTIFOSKA
DEL CAMPO AL FUTURO